




PEMBUATAN SONDE DENGAN FORMULA KOMERSIAL (FK)

			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen PPI/ 056 /RSUD-PS/XI/2018	No Revisi 01	Halaman 1 / 2
	Tanggal Terbit 6 November 2018	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan M. Sutarnan, MM *NIP. 19690709-200112 1 001	
Pengertian	Kegiatan atau proses pembuatan sonde untuk pasien menggunakan formula komersial.		
Tujuan	Menghasilkan sonde yang higienis dan layak dikonsumsi untuk pasien.		
Kebijakan	Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI		
Prosedur	1. Pembuatan sonde maksimal 30 menit sebelum waktu minum sonde yang telah ditentukan untuk pasien. 2. Ahli gizi katering memakai Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker. 3. Ahli gizi katering membersihkan permukaan meja yang akan digunakan untuk menyiapkan susu formula. 4. Ahli gizi katering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan dengan lap bersih. 5. Ahli gizi katering membilas peralatan sonde (saringan, gelas ukur, sendok, dan gelas sonde) dengan air hangat yang mengalir sebelum dipakai. 6. Peralatan bersih yang siap pakai tidak boleh dipegang di bagian yang dapat berkontak langsung dengan anggota tubuh. 7. Ahli gizi katering menyiapkan air panas $\pm 70^{\circ}\text{C}$ dan susu enteral yang akan diseduh.		

	8. Ahli gizi katering menuangkan air panas ke dalam gelas ukur sesuai volume yang dibutuhkan kemudian tambahkan susu formula sesuai takaran. 9. Ahli gizi katering mengaduk sonde hingga larut dalam air, menuang dan menyaring sonde ke dalam gelas sonde. 10. Ahli gizi katering menutup sonde dengan plastik <i>wrap</i>. 11. Ahli gizi katering memberi label pada atas plastik <i>wrap</i>. 12. Ahli gizi katering / pramusaji membersihkan tempat pembuatan sonde beserta peralatan sonde. 13. <i>Steward</i> mencuci peralatan sonde dengan sabun cair. 14. <i>Steward</i> menggunakan busa lembut untuk membersihkan bagian dalam gelas ukur dan sikat botol untuk membersihkan gelas ukur agar sisa susu yang melekat bisa dibersihkan. 15. <i>Steward</i> membilas peralatan sonde dengan air bersih yang mengalir. 16. Sonde yang siap dikonsumsi segera diberikan kepada pasien sesuai identitas label. 17. Sonde yang siap dikonsumsi maksimal 15 menit diantar sebelum waktu minum sonde yang telah ditentukan untuk pasien.
Unit Terkait	Gizi