

 RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN	EKSTUBASI		
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	No.Dokumen PP/ 004 /RSUD-PS/ III /2018 Tanggal terbit 25 Maret 201	No. Revisi 01	Halaman 1/2 Disetujui oleh Dr. Muhammad Zein PAINAN dr. H. Sutarmanto, MM NIP. 19600709 2001121001
PENGERTIAN	Suatu tindakan melepaskan pipa endotrakea dari trakea melalui hidung atau mulut		
TUJUAN	• Mengembalikan fungsi fisiologis pernafasan • Menurunkan angka mortalitas dan morbiditas		
KEBIJAKAN	Pasien yang sudah tidak memerlukan alat Bantu nafas dengan sesuai dengan kapasitas oksigenisasi dan kriteria skrining kapasitas ventilasi yang adekuat.		
PROSEDUR	<u>Persiapan tindakan :</u> 1. Pasien dan keluarga diberikan penjelasan mengenai tujuan tindakan yang akan dilakukan, serta adanya resiko dapat dilakukan reintubasi lagi bila diperlukan 2. Mengajarkan pasien cara batuk dan mengeluarkan sputum yang efektif. 3. Mengevaluasi kembali keadaan pasien apakah memenuhi kapasitas oksigenisasi dan kriteria skrining kapasitas ventilasi yang adekuat. 4. Satu jam sebelum dilakukan tindakan, pasien diberikan injeksi kortikosteroid (Dexamethasone) sebanyak 4-8mg (sesuai dengan berat badan pasien). <u>Persiapan alat :</u> 1. Set terapi oksigen 2. trolley emergensi berikut obat-obatan emergensi 3. Set ekstubasi 4. Selang katater dan alat penghisap lender <u>Tindakan :</u> 1. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan ekstubasi 2. Setting ventilator bertujuan mendorong sekret ke atas balon pipa endotrakea ke arah mulut supaya dapat dihisap.		



RSUD
Dr. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN

EKSTUBASI

No. Dokumen
PP/ 004 /RSUD-PS/ III /2018

No. Revisi
01

Halaman
2/2

3. Posisikan pasien dengan jalan nafas lebih rendah dibandingkan kaki pasien.
4. Menghisap sekret melalui pipa endotrakea (suctioning)
5. Menghisap sekret pada mulut dan hidung
6. Mengempiskan balon endotrakea dengan menggunakan alat cuffnometer.
7. Melepaskan fiksasi pipa endotrakea, sementara proses suctioning terus berjalan
8. Pipa endotrakea dilepaskan, sementara selang penghisap lendir didalam pipa untuk menghisap sisa-sisa lendir saat pipa ditarik
9. Kemudian diberikan terapi oksigen yang adekuat melalui masker wajah.

Paska Tindakan :

1. Observasi tanda vital seperti kesadaran, frekuensi pernafasan, nadi, tekanan darah, warna kulit, ekspansi dada dan saturasi oksigen perifer untuk 2-3 jam pertama.
2. Periksa analisa gas darah setelah 0,5 – 1 jam paska ekstubasi
3. Anjurkan dan motivasi pasien untuk latihan batuk yang adekuat
4. *Chest physiotherapy, nebulizer dan suctioning* seefektif mungkin

UNIT TERKAIT

- Instalasi Anestesi & Reanimasi
- Instalasi Rawat Inap
- ICU